Estudio aleatorizado de fase III para comparar Talquetamab SC combinado con Daratumumab SC y Pomalidomida (Tal-DP) o Talquetamab SC combinado con Daratumumab SC (Tal-D) frente a Daratumumab SC combinado con Pomalidomida y Dexametasona (DPd) en pacientes con mieloma múltiple refractario o recidivante que han recibido al menos 1 línea de tratamiento

Estado	**Tipo de Participantes**	**Rangos de Edad**
Fin Reclutamiento	No aportado	Mayores de 64 , Adultos (18-64 años)
Género	**Fases**	**Participantes esperados**
Ambos	Fase III	553
Resultados	**Bajo nivel intervención**	**Enfermedad rara**
Sin resultados	No	Si
Cobertura geográfica	**Ámbitos del ensayo**	**Terapia avanzada**
Sin determinar	tratamiento, seguridad, eficacia, farmacocinética, farmacodinamica	NO

Información

Identificador
2023-503467-41-00 (CTIS)

Cod. Protocolo
64407564MMY3002

Transicionado 2021-000202-22

Área terapéutica
Enfermedades [C] - Cáncer [C04]|

Enfermedad investigada
Mieloma múltiple refractario o recidivante

Título Científico

Estudio aleatorizado de fase III para comparar Talquetamab SC combinado con Daratumumab SC y Pomalidomida (Tal-DP) o Talquetamab SC combinado con Daratumumab SC (Tal-D) frente a Daratumumab SC combinado con Pomalidomida y Dexametasona (DPd) en pacientes con mieloma múltiple refractario o recidivante que han recibido al menos 1 línea de tratamiento

Justificación

No aportado

Objetivo Principal

Comparar la eficacia de Tal-DP y Tal-D, respectivamente, con DPd

Variables de Evaluación Primaria

Supervivencia libre de progresió

Momentos temporales de evaluación primaria

No aportado

Objetivo Secundario

No aportado

Variables de Evaluación Secundaria

No aportado

Momentos temporales de evaluación secundaria

No aportado

Criterios de Inclusión

Mieloma múltiple (MM) definido por siguientes criterios: a.Diagnóstico de MM según criterios diagnósticos del IMWG b.Enfermedad medible en el cribado definida por: i)Nivel proteína M sérica ¿0,5 g/dL (laboratorio central); o ii)Nivel proteína M en orina ¿200 mg/24 h.(laboratorio central); o iii)MM cadena ligera sin proteína M medible en el suero o la orina:cadena ligera libre de inmunoglobulina sérica ¿10 mg/dl (laboratorio central) y proporción anormal de

cadena ligera libre de inmunoglobulina kappa lambda sérica. Enfermedad recidivante o refractaria según se define: a. La enfermedad recidivante se define como respuesta inicial al tto. previo, seguida de enfermedad progresiva según criterios del IMWG > 60 días después tras la interrupción del tto. b. La enfermedad refractaria se define como reducción <25 % de proteína M o progresión de enfermedad confirmada según criterios del IMWG durante el tto. previo o ¿60 días después del cese del tto. Recibió al menos 1 línea previa de terapia antimieloma que incluye un PI y lenalidomida.Los pac. que hayan recibido solo 1 línea previa de terapia antimieloma deben considerarse refractarios a la lenalidomida (progresión de la enfermedad según criterios del IMWG en o dentro de los 60 días posteriores a la finalización del régimen que contiene lenalidomida).Los pac. que hayan recibido ¿2 líneas previas de terapia antimieloma deben considerarse expuestos a lenalidomida Evidencia documentada de enfermedad progresiva basada en la determinación de respuesta del investigador según criterios del IMWG en o después de su último régimen. Tener puntuación de estado funcional ECOG de 0, 1 o 2 en la selección e inmediatamente antes del inicio de la administración del tto. del estudio

Criterios de Exclusión

Contraindicaciones o alergias potencialmente mortales,hipersensibilidad o intolerancia a excipientes del fármaco del estudio
Enfermedad se considera refractaria a 1 anticuerpo monoclonal anti- CD38 según pautas de consenso del IMWG (progresión durante el tto. o dentro de 60 días posteriores al finalizar terapia con anticuerpo monoclonal anti-CD38)
Recibió tto. previo con pomalidomida
Dosis acumulada máxima de corticosteroides a ¿140 mg de prednisona o equivalente dentro de período de 14 días antes de 1ª dosis del fármaco del estudio
Compromiso activo conocido del SNC o muestra signos clínicos de compromiso meníngeo de MM. Si se sospecha cualquiera de los 2, requiere resonancia magnética nuclear (RMN) de cerebro total y una citología lumbar negativas
Leucemia de células plasmáticas en momento de selección, macroglobulinemia de Waldenström, síndrome POEMS (polineuropatía,organomegalia, endocrinopatía, prot M y cambios en la piel) o Amiloidosis primaria de cadenas ligeras de amiloid

Calendario

(Última actualización: 21/10/2026)

Autorización	Inicio de Ensayo	Inclusión Primer Paciente	Interrumpido	Reiniciado
26/10/2022	03/11/2022	08/11/2022	No aportado	No aportado

Fin de reclutamiento	Fin prematuro (España)	Fin prematuro (Global)	Fin del ensayo en España	Fin del ensayo global
19/03/2024	No aportado	No aportado	No aportado	No aportado

Promotor

Janssen - Cilag International Belgium

Turnhoutseweg 30

Contact Person

CTIS Point of Contact

+31717996133

CTISadmin@its.jnj.com

Monetary support: N/A

Tipo de promotor: Comercial

Ceim

CEIm de la Comunidad Foral de Navarra

C/ Irunlarrea, 3 31008 Pamplona

ceic@cfnavarra.es

Centros

No iniciado (--/--/----)

Clinica Universidad De Navarra

Pamplona

NAVARRA

Servicio de Hematología

Activo (29/08/2023)

Clínica Universidad De Navarra

Pamplona/Iruña

NAVARRA

Activo (15/11/2022)

Complejo Asistencial Universitario De Salamanca

Salamanca

SALAMANCA

Activo (12/12/2022)

Complejo Hospitalario Universitario De Canarias

San Cristóbal de La Laguna

STA. CRUZ DE TENERIFE

Activo (28/11/2022)

HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA

Barcelona

BARCELONA

No iniciado (--/--/----)

Hospital Clinic De Barcelona

Barcelona

BARCELONA

Servicio de Hematología

Activo (22/12/2022)

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

Murcia

MURCIA

No iniciado (--/--/----)

Hospital De Jerez De La Frontera

Jerez De La Frontera

CÁDIZ

Servicio de Hematología

Activo (03/11/2022)

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Barcelona

BARCELONA

No iniciado (--/--/----)

Hospital De La Santa Creu I Sant Pau

Barcelona

BARCELONA

Servicio de Hematología

Activo (19/01/2023)

HOSPITAL DE LEON (COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEON)

León

LEÓN

Activo (21/10/2026)

Hospital Germans Trias I Pujol

Badalona

BARCELONA

Servicio de Hematología

Activo (09/03/2023)

HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA

Badalona

BARCELONA

No iniciado (--/--/----)

Hospital Universitari Vall D Hebron

Barcelona

BARCELONA

Servicio de Hematología

Activo (23/11/2022)

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Barcelona

BARCELONA

No iniciado (--/--/----)

Hospital Universitario De Canarias

La Laguna

STA. CRUZ DE TENERIFE

Servicio de Hematología

Activo (03/11/2022)

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA FRONTERA

Jerez de la Frontera

CÁDIZ

Cerrado (16/05/2024)

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Madrid

MADRID

No iniciado (--/--/----)

Hospital Universitario De Leon

Leon

LEÓN

Servicio de Hematología

No iniciado (--/--/----)

Hospital Universitario De Salamanca

Salamanca

SALAMANCA

Servicio de Hematología

Activo (25/11/2022)

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET ALEIXANDRE

València

VALENCIA

No iniciado (--/--/----)

Hospital Universitario Dr Peset Aleixandre

Valencia

VALENCIA

Servicio de Hematología

Cerrado (29/01/2025)

Hospital Universitario Hm Sanchinarro

Madrid

MADRID

Cerrado (16/05/2024)

Hospital Universitario Ramón Y Cajal

Madrid

MADRID

Activo (16/12/2022)

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

Málaga

MÁLAGA

No iniciado (--/--/----)

Hospital Universitario Virgen De La Victoria

Malaga

MÁLAGA

Servicio de Hematología

Activo (18/11/2022)

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Madrid

MADRID

No iniciado (--/--/----)

Hospital Universitario 12 De Octubre

Madrid

MADRID

Servicio de Hematología

No iniciado (--/--/----)

University Clinical Hospital Virgen De La Arrixaca

Murcia

MURCIA

Servicio de Hematología

Medicamentos

DARZALEX 1800 mg solution for injection
SOLUTION FOR INJECTION
SUBCUTANEOUS USE

Código ATC: L01FC01 - DARATUMUMAB
Principios Activos: N/A
Huérfano
Experimental

Privigen 100 mg/ml solution for infusion
SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENUS USE

Código ATC: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Principios Activos: N/A
Experimental

Pomalidomide
CAPSULE, HARD
ORAL USE

-
Principios Activos: N/A
Experimental

Privigen 100 mg/ml solution for infusion
SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENUS USE

Código ATC: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Principios Activos: N/A
Experimental

KIOVIG 100 mg/ml solution for infusion
SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENOUS USE

Código ATC: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Principios Activos: N/A
Experimental

Privigen 100 mg/ml solution for infusion
SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENOUS USE

Código ATC: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Principios Activos: N/A
Experimental

KIOVIG 100 mg/ml solution for infusion
SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENOUS USE

Código ATC: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Principios Activos: N/A
Experimental

JNJ-64407564
SOLUTION FOR INJECTION
SUBCUTANEOUS USE

-
Principios Activos: N/A
Huérfano
Experimental

JNJ-64407564
SOLUTION FOR INJECTION
SUBCUTANEOUS USE

-

Principios Activos: N/A

Huérfano

Experimental

Dexamethasone Tablets BP 2.0mg
TABLET
ORAL USE

Código ATC: H02AB02 - DEXAMETASONA
Principios Activos: N/A

Experimental

Pomalidomide
CAPSULE, HARD
ORAL USE

-

Principios Activos: N/A

Experimental

Pomalidomide
CAPSULE, HARD
ORAL USE

-

Principios Activos: N/A

Experimental

Imnovid 2 mg hard capsules
CAPSULE, HARD
ORAL USE

Código ATC: L04AX06 - POMALIDOMIDA
Principios Activos: N/A

Experimental

Imnovid 4 mg hard capsules
CAPSULE, HARD
ORAL USE

Código ATC: L04AX06 - POMALIDOMIDA
Principios Activos: N/A

Experimental

Imnovid 1 mg hard capsules
CAPSULE, HARD
ORAL USE

Pomalidomide
CAPSULE, HARD
ORAL USE

Código ATC: L04AX06 - POMALIDOMIDA
Principios Activos: N/A

Experimental

-

Principios Activos: N/A

Experimental

Fortecortin® 2 mg Tabletten

TABLET
ORAL USE

Código ATC: H02AB02 - DEXAMETASONA
Principios Activos: N/A

Experimental

KIOVIG 100 mg/ml solution for infusion

SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENOUS USE

Código ATC: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Principios Activos: N/A

Experimental

Dexamethason 4 mg JENAPHARM®

TABLET
ORAL USE

Código ATC: H02AB02 - DEXAMETASONA
Principios Activos: N/A

Experimental

Imnovid 3 mg hard capsules

CAPSULE, HARD
ORAL USE

Código ATC: L04AX06 - POMALIDOMIDA
Principios Activos: N/A

Experimental

Sin resultados

A Phase 3 Randomized Study Comparing Talquetamab SC in Combination With Daratumumab SC and Pomalidomide (Tal-DP) or Talquetamab SC in Combination With Daratumumab SC (Tal-D) Versus Daratumumab SC, Pomalidomide and Dexamethasone (DPd), in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma who Have Received at Least 1 Prior Line of Therapy

State	Type of participants	Age Ranges
End of recruitment	Not provided	Older than 64 , Adults (18-64 years)
Gender	**Phases**	**Expected Participants**
Both	Phase III	553
Results	**Low level of intervention**	**Rare disease**
No results	No	Yes
Geographic coverage	**Areas of the study**	**Advanced therapy**
Undetermined	treatment, safety, effectiveness, pharmacokinetics, pharmacodynamics	NO

Information

Identifier
2023-503467-41-00 (CTIS)

Protocol Code
64407564MMY3002

Transitioned 2021-000202-22

Therapeutic area
Diseases [C] - Cancer [C04]|

Investigated Disease
Relapsed or Refractory Multiple Myeloma

Scientific Title

A Phase 3 Randomized Study Comparing Talquetamab SC in Combination With Daratumumab SC and Pomalidomide (Tal-DP) or Talquetamab SC in Combination With Daratumumab SC (Tal-D) Versus Daratumumab SC, Pomalidomide and Dexamethasone (DPd), in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma who Have Received at Least 1 Prior Line of Therapy

Rationale

Not provided

Main Objective

To compare the efficacy of Tal-DP and Tal-D, respectively, with DPd

Primary Endpoints

Progression-Free Survival

Temporary moments of secondary assessment

Not provided

Secondary Objective

Not provided

Secondary Endpoints

Not provided

Temporary moments of secondary assessment

Not provided

Inclusion criteria

Documented multiple myeloma as defined: a) Multiple myeloma diagnosis according to the International Myeloma Working Group (IMWG) diagnostic criteria and b) Measurable disease at screening as defined by any of the following: i) Serum M-protein level greater than or equal to (>=) 0.5 grams per deciliter (g/dL) (central laboratory); ii) Urine M-protein level >= 200 milligram (mg) per 24 hours (central laboratory); iii) Light chain multiple myeloma

without measurable M-protein in the serum or the urine: serum immunoglobulin free light chain >= 10 milligram per deciliter (mg/dL) (central laboratory), and abnormal serum immunoglobulin kappa lambda free light chain ratio Relapsed or refractory disease as defined by: i) Relapsed disease is defined as an initial response to prior treatment, followed by confirmed progressive disease by IMWG criteria greater than (>) 60 days after cessation of treatment; ii) Refractory disease is defined as less than (<) 25 percent (%) reduction in monoclonal paraprotein (M-protein) or confirmed progressive disease by IMWG criteria during previous treatment or less than or equal to (<=) 60 days after cessation of treatment Received at least 1 prior line of antimyeloma therapy including a proteasome inhibitor (PI) and lenalidomide. Participants who have received only 1 prior line of antimyeloma therapy must be considered lenalidomide-refractory (that is, have demonstrated progressive disease by IMWG criteria on or within 60 days of completion of lenalidomide-containing regimen). Participants who have received >=2 prior lines of antimyeloma therapy must be considered lenalidomide exposed Documented evidence of progressive disease based on investigator's determination of response by the IMWG criteria on or after their last regimen Have an Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status score of 0, 1, or 2 at screening and immediately prior to the start of administration of study treatment

Exclusion criteria

Contraindications or life-threatening allergies, hypersensitivity, or intolerance to study drug excipients Disease is considered refractory to an anti-cluster of differentiation 38 (CD38) monoclonal antibody as defined per IMWG consensus guidelines (progression during treatment or within 60 days of completing therapy with an anti-CD38 monoclonal antibody) Received prior pomalidomide therapy A maximum cumulative dose of corticosteroids to >=140 milligrams (mg) of prednisone or equivalent within 14-day period before the first dose of study drug Known active central nervous system (CNS) involvement or exhibits clinical signs of meningeal involvement of multiple myeloma. If either is suspected, negative whole brain magnetic resonance imaging (MRI) and lumbar cytology are required Plasma cell leukemia (per IMWG criteria) at the time of screening, Waldenström's macroglobulinemia, polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M-protein, and skin changes (POEMS syndrome), or primary amyloid light chain amyloidosis

Calendar

(Last Update: 21/10/2026)

Authorization	Start of Trial	First patient inclusion	Halted	Restarted
26/10/2022	03/11/2022	08/11/2022	Not aported	Not aported

End of recruitment	Premature end (Spain)	Premature End (Global)	Trial end (Spain)	Trial end (Global)
19/03/2024	Not aported	Not aported	Not aported	Not aported

Sponsor

Janssen - Cilag International Belgium

Turnhoutseweg 30

Contact Person

CTIS Point of Contact

+31717996133

CTISadmin@its.jnj.com

Monetary support: N/A

Sponsor type: Commercial

Ceim

CEIm de la Comunidad Foral de Navarra

C/ Irunlarrea, 3 31008 Pamplona

ceic@cfnavarra.es

Sites

not initialized (--/--/----)

Clinica Universidad De Navarra

Pamplona

NAVARRA

Servicio de Hematología

Active (29/08/2023)

Clínica Universidad De Navarra

Pamplona/Iruña

NAVARRA

Active (15/11/2022)

Complejo Asistencial Universitario De Salamanca

Salamanca

SALAMANCA

Active (12/12/2022)

Complejo Hospitalario Universitario De Canarias

San Cristóbal de La Laguna

STA. CRUZ DE TENERIFE

Active (28/11/2022)

HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA

Barcelona

BARCELONA

not initialized (--/--/----)

Hospital Clinic De Barcelona

Barcelona

BARCELONA

Servicio de Hematología

Active (22/12/2022)

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

Murcia

MURCIA

not initialized (--/--/----)

Hospital De Jerez De La Frontera

Jerez De La Frontera

CÁDIZ

Servicio de Hematología

Active (03/11/2022)

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Barcelona

BARCELONA

not initialized (--/--/----)

Hospital De La Santa Creu I Sant Pau

Barcelona

BARCELONA

Servicio de Hematología

Active (19/01/2023)

HOSPITAL DE LEON (COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEON)

León

LEÓN

Active (21/10/2026)

Hospital Germans Trias I Pujol

Badalona

BARCELONA

Servicio de Hematología

Active (09/03/2023)

HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA

Badalona

BARCELONA

not initialized (--/--/----)

Hospital Universitari Vall D Hebron

Barcelona

BARCELONA

Servicio de Hematología

Active (23/11/2022)

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Barcelona

BARCELONA

not initialized (--/--/----)

Hospital Universitario De Canarias

La Laguna

STA. CRUZ DE TENERIFE

Servicio de Hematología

Active (03/11/2022)

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA FRONTERA

Jerez de la Frontera

CÁDIZ

Closed (16/05/2024)

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Madrid

MADRID

not initialized (--/--/----)

Hospital Universitario De Leon

Leon

LEÓN

Servicio de Hematología

not initialized (--/--/----)

Hospital Universitario De Salamanca

Salamanca

SALAMANCA

Servicio de Hematología

Active (25/11/2022)

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET ALEIXANDRE

València

VALENCIA

not initialized (--/--/----)

Hospital Universitario Dr Peset Aleixandre

Valencia

VALENCIA

Servicio de Hematología

Closed (29/01/2025)

Hospital Universitario Hm Sanchinarro

Madrid

MADRID

Closed (16/05/2024)

Hospital Universitario Ramón Y Cajal

Madrid

MADRID

Active (16/12/2022)

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

Málaga

MÁLAGA

not initialized (--/--/----)

Hospital Universitario Virgen De La Victoria

Malaga

MÁLAGA

Servicio de Hematología

Active (18/11/2022)

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Madrid

MADRID

not initialized (--/--/----)

Hospital Universitario 12 De Octubre

Madrid

MADRID

Servicio de Hematología

not initialized (--/--/----)

University Clinical Hospital Virgen De La Arrixaca

Murcia

MURCIA

Servicio de Hematología

Medication

DARZALEX 1800 mg solution for injection
SOLUTION FOR INJECTION
SUBCUTANEOUS USE

ATC code: L01FC01 - DARATUMUMAB
Active Principles: N/A
Orphan Experimental

Privigen 100 mg/ml solution for infusion
SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENUS USE

ATC code: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Active Principles: N/A
Experimental

Pomalidomide
CAPSULE, HARD
ORAL USE

-
Active Principles: N/A
Experimental

Privigen 100 mg/ml solution for infusion
SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENUS USE

ATC code: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Active Principles: N/A
Experimental

KIOVIG 100 mg/ml solution for infusion
SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENOUS USE

ATC code: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Active Principles: N/A
Experimental

Privigen 100 mg/ml solution for infusion
SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENOUS USE

ATC code: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Active Principles: N/A
Experimental

KIOVIG 100 mg/ml solution for infusion
SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENOUS USE

ATC code: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Active Principles: N/A
Experimental

JNJ-64407564
SOLUTION FOR INJECTION
SUBCUTANEOUS USE

-
Active Principles: N/A
Orphan Experimental

JNJ-64407564
SOLUTION FOR INJECTION
SUBCUTANEOUS USE

-

Active Principles: N/A

Orphan Experimental

Dexamethasone Tablets BP 2.0mg
TABLET
ORAL USE

ATC code: H02AB02 - DEXAMETASONA
Active Principles: N/A

Experimental

Pomalidomide
CAPSULE, HARD
ORAL USE

-

Active Principles: N/A

Experimental

Pomalidomide
CAPSULE, HARD
ORAL USE

-

Active Principles: N/A

Experimental

Imnovid 2 mg hard capsules
CAPSULE, HARD
ORAL USE

ATC code: L04AX06 - POMALIDOMIDA
Active Principles: N/A

Experimental

Imnovid 4 mg hard capsules
CAPSULE, HARD
ORAL USE

ATC code: L04AX06 - POMALIDOMIDA
Active Principles: N/A

Experimental

Imnovid 1 mg hard capsules
CAPSULE, HARD
ORAL USE

Pomalidomide
CAPSULE, HARD
ORAL USE

ATC code: L04AX06 - POMALIDOMIDA
Active Principles: N/A

Experimental

-

Active Principles: N/A

Experimental

Fortecortin® 2 mg Tabletten

TABLET
ORAL USE

ATC code: H02AB02 - DEXAMETASONA
Active Principles: N/A

Experimental

KIOVIG 100 mg/ml solution for infusion

SOLUTION FOR INFUSION
INTRAVENOUS USE

ATC code: J06BA02 - INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR
Active Principles: N/A

Experimental

Dexamethason 4 mg JENAPHARM®

TABLET
ORAL USE

ATC code: H02AB02 - DEXAMETASONA
Active Principles: N/A

Experimental

Imnovid 3 mg hard capsules

CAPSULE, HARD
ORAL USE

ATC code: L04AX06 - POMALIDOMIDA
Active Principles: N/A

Experimental

No results